

場合ニハ科學博物館所藏ノ標本トモ引合セタ。然シナガラ、米國デ Tick-trefsil ト總稱サレテ居ル此ノ一群ハ、種類ガ多ク、從ツテ面倒デアル計リデナク、原氏ノ言ニ依レバ現ニ米國デハ、専門家が専門的ニ再検討中ノモノ、由デアルカラ、余ノ決定ガ果シテ當ヲ得テ居ルカドウカ甚ダ疑ハシイガ、一先ツ余一人ノ責任デ上記ノ如ク決定シテオイタ次第デアル。

雜 錄 Miscellaneous

〇うすばあかざ、おほばあかざ（原 寛）

昭和 12 年ノ夏、北海道北見上藻琴ノ路傍ニ見馴レヌあかざノ 1 種ガ生エテキタノデ、早速採集シテ歸京後調べタ所、既ニ朝鮮滿洲カラハ記録サレテキルうすばあかざ (*Chenopodium hybridum* L.) デアル事ガ分ツタガ、恐ラク近年牧草ニデモ交ツテ移入サレタモノデアラウト思ツテ、ソノママニシテ居タ。處ガ最近東京科學博物館ノ標本ヲ見テキル内、コノモノガ既ニ明治 42 年武田久吉氏ニヨツテ石狩山ノ鼻デ採集サレ、*Ch. Bonus-Henricus* L. ト呼バレテキタ事ヲ知ツタノデココニ記録シテオク事ニシタ。元來日本植物總覽ニハ第一版以來 *Ch. Bonus-Henricus* L. ガ歸化品トシテ載ツテキルガ、東大ニハ標本ナク、ドノ地方ニ歸化シテ居ルカ疑問ニ思ツテキタガ、コレハ多分科學博物館所藏ノ上記標本ニ基イテ、根本氏ガ加ヘタモノト思ハレル。

うすばあかざハ葉ガ卵狀三角形ヲナシ、極メテ粗大ナ不齊齒ガアリ、基部ハ截形又ハ稍心臟形デ、細長イ葉柄ヲ有スルノデ著シイガ、種子モ比較的大キク（徑 1.5–2 mm）表面ガ細カク網目狀ニ凹ンデキル點デ他種ト容易ニ區別デキル。花序ハ莖頂ニデテ幅廣ク擴散スルノガ普通デアルガ、北見産デハ稍穗狀ヲナシ *f. spicatum* BECK ノ形デアツタ。多分北海道デハ處々ニ見ラレルモノデアラウ。眞ノ *Ch. Bonus-Henricus* L. ガ我國ニハイツテキルカドウカ私ハ未ダ標本ヲ見タ事ガナイ。

Chenopodium hybridum L., Sp. Pl. ed. 1, 219 (1753).

Ch. Bonus-Henricus (non L.) sensu MAKINO et NEMOTO, Fl. Jap. 1028 (1925); ed. 2, 271 (1931); NEMOTO, Fl. Jap. Suppl. 184 (1936).

Nom. Jap. *Usuba-akaza*, *Ōba-akaza*.

Hab. Hokkaido prov. Isikari: Yamano-hana (H. TAKEDA, Sep. 29, 1909, no. 29226 in Mus. Sc. Tokyo). prov. Kitami: Kami-mokoto (H. HARA, Jul. 22, 1937).

(H. HARA)